


webka.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Исследование среди врачей-неврологов
«Тактики и подходы к лечению больных
с деменцией и болезнью Альцгеймера»

РОССИЯ



ДЕКАБРЬ, 2020г.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ:

- ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ С ВРАЧАМИ-НЕВРОЛОГАМИ
- 1010 РЕСПОНДЕНТОВ / РОССИЯ (17 РЕГИОНОВ)

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

- ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:

- ТАЙМИНГ ИНТЕРВЬЮ: ДО 15 МИНУТ

ТЕЛЕФОННОЕ ИНТЕРВЬЮ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ БЛОКИ ВОПРОСОВ - ПОТОК ПАЦИЕНТОВ, ЗНАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕМЕНЦИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА, ЦЕЛЕВОЙ ПРЕПАРАТ МЕМАНЕЙРИН



ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:


ИЗУЧЕНИЕ ТАКТИК И ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДЕМЕНЦИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА СРЕДИ ВРАЧЕЙ-НЕВРОЛОГОВ

01

1010 врачей-неврологов

02

63% - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛПУ
37% - КОММЕРЧЕСКОЕ ЛПУ



03



РЕГИОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Москва,
Московская, Волгоградская, Воронежская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская,
Ростовская, Самарская, Свердловская и
Челябинская области,
Краснодарский, Красноярский и Пермский край,
Республики Башкортостан и Татарстан.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- ПОТОК ПАЦИЕНТОВ С ДЕМЕНЦИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
- ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА
- ЗНАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ МЕМАНТИН
- ВЫБОР ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕМЕНЦИЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА
- ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ-НЕВРОЛОГОВ К ЖИДКОЙ ФОРМЕ И ПРИЧИНЫ СМЕНЫ УЖЕ НАЗНАЧЕННОЙ ТЕРАПИИ
- ПРЕЖПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ



Общие выводы

- Около **9 пациентов** с деменцией и болезнью Альцгеймера в среднем врач-невролог наблюдает в месяц, из которых 5 человек с начальной стадией, 3 – средней стадии и 1 пациент с тяжелой степенью тяжести заболевания.
- Снижение памяти, снижение способности к самообслуживанию и дезориентация – основные жалобы, с которыми поступают пациенты с подозрением на деменцию Альцгеймеровского типа. В большинстве случаев (около 90%) врач сам инициирует терапию – только в 4% случаев врачи работают с пациентами, у которых терапия уже назначена. При необходимости направление к психиатру получает большинство пациентов (97%).
- Во время начальной стадии заболевания чаще врачи работают с пациентами в возрасте от 60 лет, средняя и тяжелая стадии заболевания обычно характерны для пациентов старше 70 лет.
- Значимых предпочтений при выборе терапии для коррекции когнитивных и поведенческих нарушений для больных с деменцией среди врачей не выделено, каждый вид терапии назначается большинством врачей. Использование препарата с действующим веществом Мемантин наиболее эффективно на начальной с средней стадиях заболевания.
- Лидером по уровню знания и назначения среди препаратов с действующим веществом Мемантин является препарат с торговым наименованием Акатинол Мемантин. Его знает абсолютное большинство врачей (80%), также чаще других назначают для лечения деменции и болезни Альцгеймера, вторым и третьим по популярности являются Мемантин и Меманталь соответственно.
- Самыми важными аргументами при выборе препарата участники исследования считают эффективность и оригинальность, третий по важности – ценовой фактор.
- По мнению опрошенных наиболее удобной формой для лечения пациентов являются таблетки (65%), примерно каждый второй специалист отметил пластырь, форму капель считают удобной 36% участников исследования.
- Примерно треть врачей (31%) отметили, что регулярно наблюдают пациентов с нарушениями акта глотания.
- Не все пациенты могут самостоятельно точно следовать предписаниям врача по приему препарата, тем самым нарушая назначенную врачом терапию – на этот фактор указал примерно каждый десятый врач. Побочным эффектом врачи считают и фактор возбудимости во время терапии мемантином. В случаях отказа от назначенной врачом терапии, в первую очередь специалисты стараются убедить в необходимости продолжения приема препарата самих пациентов или их родственников. Реже врачи прибегают к изменению дозировки, замене препарата или добавлению других препаратов для устранения нежелательной симптоматики.
- Только 6% врачей отметили, что знакомы с препаратом под названием Меманейрин (мемантин в каплях). 59% не слышали о препарате. Недостаточность информации является определяющим фактором низкого уровня назначения препарата Меманейрин. Только 5% врачей отметили, что не нуждаются в дополнительных данных о препарате.


Общие результаты *шкала.*



Общие результаты

Поток пациентов

В среднем 9 пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера врач наблюдает в месяц, из которых 5 человек - с начальной стадией, три - на средней стадии и 1 пациент с тяжелой степенью болезни.



с деменцией и болезнью Альцгеймера врач наблюдает в среднем в месяц

Стадия заболевания

начальная (умеренная)



средняя



тяжелая



A-0. Доктор, уточните, сколько всего пациентов, с деменцией и болезнью Альцгеймера, вы наблюдаете, в среднем, в месяц?// A-2_1. Какое число больных приходится на (умеренную) стадию заболевания// A-2_2. Сколько пациентов со средней степенью тяжести Вы принимаете в месяц// Сколько больных приходится на тяжелую степень тяжести
N=1010// 1010// 1009// 1010

Общие результаты


Поток пациентов

Снижение памяти, дезориентация и снижение способности к самообслуживанию – три основных жалобы, с которыми поступают пациенты с подозрением на деменцию Альцгеймеровского типа. В большинстве случаев (около 90%) врач сам инициирует лечение – только в 4% случаев врачи сталкиваются с пациентами с терапией. При необходимости направление к психиатру получает большинство пациентов (97%).


Жалобы



Назначение терапии



Направление к психиатру



А-3. С какими жалобами чаще всего к Вам поступает первичный пациент с подозрением на деменцию Альцгеймеровского типа // А-3.1 Доктор, уточните, пожалуйста, как часто Вы инициируете терапию больным с деменцией и болезнью Альцгеймера? // А-3.2 Направляете ли Вы таких больных также на прием к психиатру, в случаях, когда это необходимо?


N=1004// 1004// 1005// 1004

Общие результаты

Поток пациентов

Во время начальной стадии заболевания врачи чаще работают с пациентами в возрасте от 60 лет, средняя и тяжелая стадии заболевания чаще встречается у пациентов старше 70 лет.

Стадия заболевания




А-2. Если считать, что вы принимаете X пациентов в месяц с деменцией и болезнью Альцгеймера, распределите их по степени тяжести заболевания// А-4. В каких возрастных группах находятся такие пациенты в каждой из стадий заболевания, которых Вы принимаете?
N=1010// 1005// 999// 977

Общие результаты

Знание и назначение препаратов

Значимых предпочтений при выборе терапии для коррекции когнитивных и поведенческих нарушений для больных с деменцией среди врачей не выделено, каждый вид терапии назначается врачами примерно одинаково. Использование препарата с действующим веществом Мемантин для коррекции когнитивных и поведенческих нарушений для больных с деменцией наиболее эффективно на начальной с средней стадиях заболевания, так считают 82% и 74% врачей соответственно.




Б-1. Доктор, уточните, пожалуйста, какие виды медикаментозной терапии Вы чаще всего используете для лечения больных с деменцией и болезнью Альцгеймера? //Б-2 На какой стадии заболевания Вы считаете уместным использование препаратов с действующим веществом Мемантин для коррекции когнитивных и поведенческих нарушений для больных с деменцией ?

N=1010// 1010

Общие результаты

Знание и назначение препаратов

Лидером по уровню знания и назначения среди препаратов с действующим веществом Мемантин является Акатинол Мемантин. Его знает абсолютное большинство врачей (80%), его также чаще других назначают для лечения деменции и болезни Альцгеймера, вторым и третьим по популярности являются Мемантин и Меманталь соответственно. Стоит отметить, что при подсказке названий препаратов врачи чаще вспоминают Мемантин Рихтер, Мемантин Канон и Меманейрин.




Б-2. Уточните, пожалуйста, какие препарат с действующим веществом Мемантин Вы знаете?// Б-3. Сейчас я зачитаю Вам названия препаратов, относящихся к этой группе// Б-4. Доктор, уточните, пожалуйста, а какой препарат из перечисленного списка, Вы назначаете чаще остальных?

N=997// 1002// 1010

Общие результаты

Знание и назначение препаратов

Чаще других врачи отдают предпочтение препарату Акатинол Мемантин, вторым по частоте назначений является препарат Мемантин. Наиболее важными аргументами при выборе препарата участники исследования считают эффективность и оригинальность, примерно каждый десятый врач отметил ценовой фактор.



Причины

Эффективный	24%
Оригинальный	23%
Цена	9%
Удобная форма приема	4%
Доступен	3%
Меньше побочных эффектов	3%
Разные дозировки	3%
МНН	2%
Опыт назначения	2%
Хорошо переносится	2%
Действующее вещество	2%
Безопасный профиль	2%
Проверен	2%


Б-4. Доктор, уточните, пожалуйста, а какой препарат из перечисленного списка, Вы назначаете чаще остальных? \\ Б-5. Почему?
N=1005 \\ 1005

Общие результаты


Знание и назначение препаратов

По мнению опрошенных наиболее удобной формой для лечения являются таблетки (65%), примерно каждый второй специалист отмечает удобство пластыря форма капель нравится 36% участников исследования. Примерно каждый десятый врач отметил, что у пациентов часто встречается нарушение акта глотания и каждый пятый отмечает небольшой процент таких пациентов.

Нарушение акта глотания



Максимально удобная форма



Другое <2%

Б-6. Если рассматривать сопутствующие патологии больных, как часто у Ваших пациентов наблюдается нарушение акта глотания (дисфагия и пресбифагия), особенно на поздних стадиях заболевания? // Б-9. Как вы считаете, прием терапии в какой лекарственной форме максимально удобен для пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера?

N=1001//1010

Общие результаты


Знание и назначение препаратов

Не всегда пациенты могут самостоятельно точно следовать предписаниям врача по приему препарата, тем самым нарушая назначенную врачом терапию – на этот фактор указал почти каждый десятый врач. Примерно с такой же частотой врачи называли проблемой фактор возбудимости во время терапии мемантином. В случаях отказа от назначенной врачом терапии в первую очередь специалисты стараются убедить в необходимости продолжения терапии самих пациентов или их родственников. Реже для продолжения лечения прибегают к изменению дозировки, замене препарата или добавлению препаратов для устранения нежелательной симптоматики.

Проблемы на терапии мемантином



Для продолжения терапии



Б-7. С какими распространенными проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь со стороны пациентов, которые находятся на терапии мемантином? //Б-8. Если взять вкуне все вышеперечисленные факторы, какие действия вы предпринимаете, для того, чтобы пациент продолжил терапию?


N=1005// 1005

Общие результаты



Меманейрин

Только 6% врачей отметили, что знакомы с препаратом под названием Меманейрин (в каплях). 59% не слышали о препарате. Недостаточность информации является определяющим фактором низкого уровня назначения препарата Меманейрин. Только 5% врачей отметили, что не нуждаются в дополнительных данных о препарате.

Знание Меманейрин



Назначение Меманейрин



С-1. Подскажите, как хорошо Вы знакомы с Мемантином в жидкой форме под названием Меманейрин (в каплях)?// С-2. Используете ли в своих назначениях Мемантин в жидкой форме (капли) по названию Меманейрин?// С-3. Уточните, какой информации Вам не хватает, для того, чтобы начать или увеличить назначение препарата именно в форме капель?

N=1000// 419// 1010

Продажи в аптеках и рекомендации фармацевтов препаратов с МНН Мемантин

Аптеки

Чуть больше половины фармацевтов (58%) рекомендуют только один препарат, чаще остальных в таких случаях сотрудники озвучивали название Мемантин (40%).

В целом, учитывая все ответы, примерно каждый второй провизор рекомендует Акаминол Мемантин и Мемантин без уточнения. Другие препараты озвучивают значительно реже.

Рекомендации в аптеках



Препараты Топ 10



1. Выберите дальнейший вариант: Фармацевт порекомендовал несколько наименований и фармацевт порекомендовал только одно наименование//Выберите название, * которое озвучил сам фармацевт* (один ответ)// Советует несколько (суммарно все рекомендации)
N=445// 260// 445

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ДЛ Я ПАЦИЕНТА БЫЛА БЫ УДОБНА ЖИДКАЯ ФОРМА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, С ЧЕМ СВЯЗАН ВОЗРАСТ БОЛЬНЫХ НА СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАК ЖЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ БОЛЬНЫХ – ПРЕСБИФАГИЯ И ДИСФАГИЯ, НЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ, НЕДОВЕРИЕ К ТАБЛЕТКАМ И КАПСУЛАМ,

БОЛЬШИНСТВО ВРАЧЕЙ МЕНЯЮТ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ – СТОИМОСТЬ ТЕРАПИИ, КОМПЛАЕНТНОСТЬ, ВОЗБУДИМОСТЬ И НАРУШЕНИЕ СНА

- 36% ВРАЧЕЙ СЧИТАЮТ ФОРМАТ КАПЕЛЬ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ, ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕМАНЕЙРИН, ОСТАВШАЯСЯ ЧАСТЬ ВРАЧЕЙ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ПЛАСТЫРЬ И ПОРОШКИ. ПРИ ЭТОМ, ПОДОБНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЖМЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ РОССИИ

ВСЕГО 37% ВРАЧЕЙ В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ НАБЛЮДАЮТ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА И СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ, ЧАЩЕ – В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛПУ

Спасибо!

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ WEBKA/ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

ИНН 772041279

Москва, Марتنновская, 5/1 оф/54 Тел: + 7 499 706 00 45

E-mail: sales@webka-marketing.ru

www.webka-marketing.ru

www.dev.webka.training

webka.

маркетинг погрузке

www.webka-marketing.ru